



دانشگاه علوم پزشکی گلستان
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله

موضوع :

فاویسم نوزادی



واحد تنظیم کننده: گروه آموزش به بیمار

زمستان ۱۴۰۰

دیفن هیدرامین

سولفاستامید

نالیدیکسیک اسید

ویتامین ث و کا



منبع :

کتاب پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

،ربابه ضیغمی

دارو های ممنوعه در فاویسم

آسپرین (ASA)

اسیدنالدیکسیک

تولونیوم

انواع ایزونیازید

آمینوفازون

کلرامفنیکل / سولفاستامید

دی مرکارپرول / کنیدین

کوتریموکازول



فاویسم

علائم فاویسم:

- نوزاد مبتلا به فاویسم در بزرگسالی باید از خوردن و حتی بو کردن گرده باقالا اجتناب کند
- در محیط اطراف فرد مبتلا به فاویسم از حشره کش یا نفتالین استفاده نشود
- - پرهیز از خوردن حبوباتی مثل لوبیا، عدس، لوبیا و نخود از مصرف داروهایی مانند داروی ضد مالاریا یا داروهای مسکن نظیر آسپرین اجتناب شود.
- - مادری که فرزند مبتلا به فاویسم دارد باید از مصرف باقالا و آسپرین یا هر نوع ماده ای که سبب بروز علائم فاویسم می شود خودداری نماید چرا که این مواد از طریق شیر دادن به نوزاد منتقل می شود.
- - پیشگیری از عفونت های باکتریایی و ویروسی که از شایع ترین دلایل ایجاد بروز علائم فاویسم است.
-



زردی رنگ پوست، تیره شدن ادرار، سفید یا زرد شدن چشم ها،
بالا رفتن دمای بدن تا ۳۸ درجه، بی قراری، تهوع، درد شکمی یا
درد پشت، احساس ضعف، خستگی و بی حالی، افزایش ضربان



قلب، افزایش تعداد تنفس

کودک شما مبتلا به بیماری فاویسم است که علت آن
کمبود یا نقص آنزیمی در گلبول های قرمز به نام G6PD
می باشد. بروز این بیماری با مصرف باقالا و بعضی از
داروهای مصرف شده و یا عفونت هایی مثل بیماری های
تب دار ارتباط است.

فاویسم بیماری است که وابسته به جنس می باشد و بیش
از میلیون ها نفر در جهان به این بیماری مبتلا هستند. ژن
این بیماری بر روی کروموزوم ایکس جنس مذکر قرار
دارد، بنابراین ظهور کامل این نقص در فرد مذکر روی می
دهد و فرد مونث ناقل است. کمبود این آنزیم می تواند در
نوزادی خود را به صورت زردی نشان دهد.

درمان

بیماری فاویسم درمان قطعی ندارد و بهترین درمان جلوگیری از بروز

علائم آن می باشد که در ادامه به چند روش پیشگیری از ابتلا به